









DEVTRINOL® F

DEVTRINOL® F è un erbicida residuale ad assorbimento esclusivamente radicale. Agisce sui semi in germinazione e sulle plantule delle infestanti. Non esplica invece alcuna azione nei riguardi delle infestanti già nate al momento del trattamento.

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (L/ha)	NOTE
 Patata	Pre-Semina o Pre-Trapianto	2,2 3,0 3,5-4,0	Terreni leggeri. Terreni medio impasto. Terreni pesanti e dotati di sostanza organica. Il prodotto deve essere incorporato con una leggera erpicatura o con l'irrigazione.
 Pomodoro			
 Melanzana			
 Tabacco			
 Cavolo Cappuccio			
 Cavolfiore			
 Ravizzone			
 Riso	1,4-2,0		

INFESTANTI CONTROLLATE

Alopecurus myosuroides (Coda di topo), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavoni), *Leptochloa fascicularis* (Leptocloa fascicolata), *Lolium multiflorum* (Loiutto italiano), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola annua), *Setaria viridis* (Pabbio comune), *Setaria glauca* (Pabbio rossastro), *Sorghum halepense* in germinazione da seme (Sorghetta), tutti i cereali infestanti a nascita spontanea, *Anthemis arvensis* (Camomilla selvatica), *Chenopodium album* (Chenopodio), *Galium aparine* (Attaccamani), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Oxalis acetosella* (Acetosella), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Stellaria media* (Centocchio), *Thiaspis arvensis* (Erba storna), *Veronica spp.* (Veronica), *Alisma spp.* (Mestolacce), *Ammania coccinea* (Ammania arrossata), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (Quadrettone), *Heteranthera spp.* (Eterantere).

Sono invece mediamente sensibili: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Mercurialis annua* (Mercuriella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore)



UPL ITALIA s.r.l.
Via Terni, 275
47522 S. Carlo di CESENA (FC)
Tel. +39 0547 66 15 23 - fax +39 0547 66 14 50

info@uplitalia.com
www.upl-ltd.com/it



DEVTRINOL® F

Erbicida di pre-emergenza per il controllo di numerose infestanti

- Ampio spettro d'azione
 - graminacee (Digitarie, Setarie, Giavoni ecc)
 - monocotiledoni non graminacee (Ciperacee, Alismatacee, *Heteranthera spp.* ecc)
 - numerose dicotiledoni
- Elevata sinergia con altri erbicidi complementari (pendimethalin, clomazone, ecc)
- Gestione delle popolazioni resistenti agli erbicidi ALS e/o ACCasi inibitori





DEVRI[®]NOL F

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Erbicida di pre-emergenza per il controllo di numerose infestanti

Sostanza attiva: napropamide 450 g/L

Dose: 1,4 - 2,0 L/ha

Formulazione: pasta fluida

Epoca d'impiego: pre-emergenza (della coltura e delle infestanti)

Assorbimento: esclusivamente radicale


Meccanismo d'azione: peculiare e non affetto da problematiche di resistenza
(Codice HRAC/WSSA: Z/0)

Modalità operative per il riso:


- Assicurare un adeguato interrimento del seme
- Applicare preferibilmente su terreno umido
- Incorporare il prodotto provvedendo ad un'irrigazione (circa 10 mm d'acqua) se non si verificano eventi piovosi entro 7 - 10 giorni dal trattamento




Spettro d'azione: Graminacee



Spettro d'azione: Ciperacee



Spettro d'azione: Alismatacee ed Eterantere



Prove effettuate da centri di saggio autorizzati